

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Antisedan 5 mg/ml oldatos injekció kutya és macska részére A.U.V.

### 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Orion Corporation

Orionintie 1, FI-02200 ESPOO, Finnország

### 2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Antisedan 5 mg/ml oldatos injekció kutya és macska részére A.U.V.

Atipamezol-hidroklorid

### 3. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

1 ml oldatos injekció tartalmaz:

#### Hatóanyag:


Atipamezol-hidroklorid 5,0 mg

#### Segédanyagok:

Metil-parahidroxibenzoát (E218) 1,0 mg

### 4. JAVALLAT(OK)

Kutyának és macskának a medetomidin és dexmedetomidin szedatív és fájdalomcsillapító, valamint szív-érrendszeri és légzőszervi hatásainak megszüntetésére.



### 5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

### 6. MELLÉKHATÁSOK

Kedvezőtlen hatások nagyon ritkán fordulnak elő. Beszámoltak hányásról, fokozott nyáladzásról, zihálásról, bélsárürítésről, de ezek a tünetek nagyon ritkák. Néhány egyednél hirtelen múltó hiperaktivitást és tachycardiát észleltek.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

### 7. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya, macska

### 8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓDOK CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Intramuszkuláris (IM) vagy szubkután (SC) alkalmazásra. A hatás gyorsabb IM adagolás esetén. A készítmény adása szükség esetén megismételhető.

Az atipamezol-hidrokloridot általában 15-60 perccel a medetomidin- vagy dexmedetomidin-hidroklorid után kell adni. Az állat 5-10 perc alatt ébred fel.

Kutyáknak: az Antisedan adagja milliliterben számítva megegyezik a Domitor vagy a Dexdomitor 0,5 mg/ml adagjával. Az Antisedan adagja milliliterben egy ötöde a Dexdomitor 0,1 mg/ml adagjának. Mikrogrammban számítva az atipamezol adagja a medetomidin adagjának ötszöröse, illetve a dexmedetomidin adagjának tízszerese.

Macskáknak: az Antisedanból fele annyi millilitert kell adni mint a Domitorból vagy a Dexdomitor 0,5 mg/ml-ből, és tizedét (1/10) a Dexdomitor 0,1 mg/ml-nek. Az atipamezol mikrogrammban számított adagja a medetomidin adagjának 2,5-szerese, illetve a dexmedetomidin adagjának ötszöröse.

## Adagolási példák

	<b>Domitor adag</b>	<b>Dexdomitor 0,5 mg/ml adag</b>	<b>Dexdomitor 0,1 mg/ml adag</b>	<b>Antisedan adag</b>
<b>Kutya</b>	1000 µg/m <sup>2</sup> testfelület	500 µg/m <sup>2</sup> testfelület	500 µg/m <sup>2</sup> testfelület	5000 µg/m <sup>2</sup> testfelület
	40 µg/kg = 0,4 ml/10 kg	20 µg/kg = 0,4 ml/10 kg	20 µg/kg = 2 ml/10 kg	200 µg/kg = 0,4 ml/10 kg
<b>Macska</b>	80 µg/kg = 0,4 ml/5 kg	40 µg/kg = 0,4 ml/5 kg	40 µg/kg = 1,0 ml/3 kg*	200 µg/kg = 0,2 ml/5 kg 0,1 ml/3 kg

\* Macskának 3 kg felett a Dexdomitor 0,5 mg/ml ajánlott.

Ébresztéshez az Antisedan akkor is használható, ha az állatot medetomidin / dexmedetomidin és ketamin kombinációjával altatták. Az Antisedan adagja ebben az esetben is ugyanannyi mintha a szedálást csak medetomidinnel vagy dexmedetomidinnel végezték volna, azzal a megjegyzéssel, hogy az Antisedant csak a ketamin beadását követő legalább 30-40 perc elteltével lehet alkalmazni.

## 9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

### 10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

### 11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a dobozon feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 28 napig.



### 12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések

A készítmény alkalmazása után az állatoknak az ébredéshez nyugodt körülményeket kell biztosítani. Az ébredési idő alatt az állatot nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Az állat etetése vagy itatása előtt minden esetben meg kell győződni a normál nyelési reflex visszatéréséről.

Az Antisedan 30-40 percnél korábban nem adható, ha a medetomidint vagy a dexmedetomidint ketaminnal adják együtt. Ha az alfa-2 agonista hatása korábban eliminálódik, a ketamin megmaradó hatása konvulziót okozhat.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

A készítmény ne kerüljön bőrre, szembe vagy nyálkahártyára. Ha véletlenül bőrre kerül, az érintett területet azonnal le kell mosni tiszta folyó vízzel. A bőrrel közvetlenül érintkező szennyezett ruházatot le kell venni.

A véletlen lenyelés vagy öninjekciózás elkerülése érdekében körültekintéssel kell eljárni. Véletlen lenyelés vagy öninjekciózás esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, és a használati utasítást meg kell mutatni.

Vemhesség, laktáció:

Mivel az Antisedan vemhesség és laktáció alatti alkalmazása nem kellőképpen dokumentált, vemhes vagy szoptató állatokon nem alkalmazható.

Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók:

Nemspecifikus centrális stimulánsok potenciálják az atipamezol aktiváló hatását.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

Az atipamezol-hidroklorid túladagolása esetén átmeneti tachycardia és izgalmi tünetek (hiperaktivitás, izomremegés) jelentkezhetnek. Ezek a tünetek általában enyhék, néhány órán belül megszűnnek, és nem igényelnek kezelést.

Inkompatibilitások:

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel.

**13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)**

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

**14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA**

2014. július 15.

**15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

10 ml injekciós üvegben, papírdobozban.

