

Aptus[®] EQUINE APTO-FLEX

Termékismertető

1. A készítmény neve

Aptus[®] Equine Apto-Flex szirup lovak számára

2. Termékforma

Szirup

3. Összetétel:

100 ml tartalma:

Nátrium hyaluronát 467 mg

Glukozamin szulfát 2667 mg

Kondroitin szulfát 1333 mg

Hidrolizált kollagén 16667 mg

MSM (metil-szulfonil-metán) 3333 mg

E-vitamin (D,L alfa tokoferol acetát) 1003 mg

Segédanyagok:

Invert szirup (70%) 40 g

Citromsav 0,07 g

Szorbinsav 0,15 g

4. Célállatfajok

Ló

5. A készítmény felhasználási területének rövid leírása, felhasználási javaslat, javallatok

Javallat(ok):

Általában: az ízületi porc és inak táplálására, regenerálására lovakban. Versenyszezon előtt vagy után, intenzív fizikai aktivitás idején sportlovak számára, az ízületi porc és inak táplálására, védelmére és regenerálására. Minden lóban a mozgásképeség javítására. Traumás sérülések, ortopéd sebészeti beavatkozások után, ortopéd eredetű fájdalom esetén segíti és gyorsítja a gyógyulást, könnyíti az ízületek mozgékonyágát, lassítja az artrózis folyamatát.

A helyes alkalmazásra vonatkozó javaslat:

Az Aptus[®] EQUINE APTO-FLEX szirup gyógyhatású, oldott formában készült, új típusú, kondroprotektív készítmény lovak számára. Általában az ízületi porc és inak táplálására, regenerálására használható. A porc és az inak egészségére ható tradicionális anyagok (glukozamin szulfát, kondroitin szulfát, MSM) ideális kombinációja hialuronsavval és kollagénnel került kiegészítésre. A készítmény a takarmányhoz keverve feleltethető.

Az alkalmazás időtartama függ az indikációtól és az Aptus[®] EQUINE APTO-FLEX szirup hatásától. Megelőzési célból 3 hónapos adagolás javasolt, majd 1 hónapos kihagyást követően a ciklus ismétlődhet. Szükség esetén a készítmény élethosszig használható.

6. Adagolás és az alkalmazás módja

Ló:


250 ttkg alatt: 15 ml naponta egy alkalommal,

250 ttkg felett: 30 ml naponta egy alkalommal, szájon át.

7. Ellenjavallatok (ha vannak)

8. Mellékhatások (ha vannak)

9. Figyelmeztetések (ha szükséges)



10. Lejárati idő

Eltarthatóság: a gyártástól számított 24 hónap

11. Tárolási előírások

Különleges tárolási előírások: bontatlanul szobahőmérsékleten (25°C), száraz helyen tárolandó.

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárat időn belül szabad felhasználni.

Felbontást követően 3 hónapon belül fel kell használni.

Fagytól és közvetlen napsugárzástól óvni kell.

12. Csomagolás (a tartály vagy csomagolóanyag jellege, kiszerelési egységek)

1000 ml poli-etilén flakon, poli-etilén biztonsági kupakkal, karton dobozban.

13. „Gyermekek elől elzárva tartandó!” felirat

Gyermekek elől elzárva tartandó!

14. „Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra!” felirat

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra!

15. A fel nem használt anyag és a hulladék kezelésének módja

A fel nem használt készítményt, valamint a belőle származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

16. A készítmény és a dokumentáció tulajdonosa

ORION CORPORATION

P.O. Box 65, FI - 02101 Espoo

Tel.: +358104261 Fax.: +358 10 426 7771

A gyógyhatású készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a magyarországi képviselőhöz:

Orion Pharma Kft.

1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6

Tel.: +36 1 239 9095, Fax +36 1 237 0603

Gyártó:

CANAMIPHARM s.r.o.

Na Brne, 566, 500 06 Hradec Kralové, Csehország

17. A készítmény nyilvántartási száma

090/1/2011 MgSzH ÁTI

